

Nektarstribе

Hvad er en nektarstribе?

En nektarstribе består af blomstrende urter gennem hele vækstsæsonen. Nektarstriben er beslægtet med urtestribе (se [faktaark om urtestribе](#)), men i nektarstriben behøver urterne ikke være vilde danske planter, de kan også være kulturplanter. Nektarstriben kan være flerårig.

Hvad er formålet?

Mange af de bestøvende insekter er stærkt truede arter i Danmark. Bier og sommerfugle har svært ved at finde blomster med pollen og nektar i sommerhalvåret. Det gælder især når rapsen, piletræerne og de levende hegns tjørn, roser, slåen, æbler og kirsebær er afblomstret. I korte perioder, når græsmarken eller rapsmarken blomstrer med kløver, mælkebøtter eller raps, er der masser af føde, men kort tid efter er der ikke længere noget at finde, og så sulter de vilde bier. Nektarstriben kan være med til at udvide sæsonen med nektar.

Hvem gavner det?

Vi har mere end 250 arter af vilde bier i Danmark og mere end 1000 arter af dag- og natsommerfugle. Dertil kommer et stort antal svirreflugter, andre fluer og biller, som også søger føde i blomsterne. De fleste arter er nyttedyr, som enten bestøver vilde planter og afgrøder eller æder skadedyr som eksempelvis bladlus.

Hvor og hvordan etablerer man nektarstribе?

En nektarstribе kan med fordel kombineres med en insektvold, stenbunke eller gamle træer, hvor bierne kan have deres redesteder. Levende hegn eller krat med blomstrende buske og træer som slåen, rose, tjørn, fuglekirsebær, pil og lind er gode at have i nærheden, da de kan supplere nektarstriben gennem foråret.

Det gælder om at lave en god jordbehandling for at undgå, at kulturgræsser og kvik undertrykker blomsterne. Herefter udsås frø af blomster. Blomsterne behøver ikke at være hjemmehørende, men det er vigtigt, at der er mange slags med forskellige blomstringstidspunkter. Hjemmehørende arter har den fordel, at de kan understøtte eksempelvis de sommerfuglearter, der kræver bestemte plantearter. Gode hjemmehørende arter er for eksempel merian, blåhat, slangehoved, rødkløver, bugtet kløver, hjortetrøst og vild gulerod. Blandt kulturplanterne er for eksempel honningurt, hjulkronе, citronmelisse, morgenfrue, kartebolle, stokrose og lucerne. Brombær er også god, da den har sen og længevarende blomstring og passer sig selv.

Blomstrende honningurt, som står så åbent, at der også er plads til vilde planter. Foto: Jørn Pagh Bertelsen.

Hvordan kan man se, at det virker?

Når det summer af bier og humlebier, så er det lykkedes. Man kan også se, om der vedvarende er blomster i nektarstriben, det er et godt tegn.

Hvordan plejes nektarstriber?

Mange blomster vil have fordel af 1-2 årlige høslæt, for eksempel 1. juni og 1. september. Det er en god idé at lade en andel af arealet stå uslået, så man ikke fjerner alle blomster på samme tid. Ved slåning kan man også holde eventuelle ukrudtsarter lidt i ave og begrænse deres frøspredning. Det afslåede materiale skal fjernes for at sikre lys til små planter og jordlevende insekter. Sprøjtning med pesticider i nærheden af blomster og redesteder skal undgås, da bierne er meget følsomme over for sprøjtemidler.

Varighed

Hvis man bruger flerårige arter, kan de blomstre igen året efter, og man behøver ikke så på ny.

Regler

Læs om regler for tiltag på støtteberettigede marker i faktaarket: [Gør markerne til gode levesteder for markvildtet.](#)

Kejserkåbe og dagpåfugleøje søger nektar i Hjortetrøst.
Foto: Rasmus Ejrnæs.

